

慢性硬膜下血腫除去術を受けられる患者様へ

ID: @PATIENTID

患者氏名(@PATIENTNAME 様)

@PATIENTAGEYEAR 歳 主治医()

受持ち看護師()

月日	/	/	/	/	/	/	/	/	/
経過	入院・手術当日	手術後	術後1日目	術後2日目	術後3日目	術後4日目	術後5日目	術後6日目	術後7日目【退院日】
達成目標	不安に思っていることを伝えることができる 不安なく手術が受けられる	術後に安静が守れる	意識の低下・麻痺の増強がない	意識の低下・麻痺の増強がない	手術の傷に異常がない	手術の傷に異常がない	抜糸後の傷に異常がない	CTの結果再出血を認めない	退院後の生活の留意点を本人・家族が理解できる
治療・処置 薬剤	・点滴を開始します ・内服薬は看護師がお預かりします	・点滴が持続的にあります ・頭の傷の部分から排液目的の管がついています	・点滴が持続的にあります ・手術後の傷の観察をします ・頭からの排液の管を抜きます ・内服薬が開始になります	・点滴が持続的にあります ・手術後の傷の観察をします	・午前中に点滴が終了します ・手術後の傷の観察をします ・傷の糸を部分的に抜糸します	・手術後の傷の観察をします ・傷の糸を全抜糸します	・手術後の傷の観察をします		
検査	・血液検査 ・X線撮影(頭部、胸部) ・心電図 ・頭部CT 	・X線撮影(頭部) 	・血液検査 ・頭部CT 				・血液検査 	・頭部CT 	
活動 安静度	・ベッド上で安静になります	頭に管が入っているため、自分で触らないように両手をひもなどで固定することがあります	CT検査後に医師の許可で看護師の付き添い歩けるようになります	看護師の付き添いで病棟内を歩くことができます	病棟内を一人で自由に歩くことができます(歩行が安定している場合)	病棟内を一人で自由に歩くことができます(歩行が安定している場合)	病棟内を一人で自由に歩くことができます(歩行が安定している場合)	病棟内を一人で自由に歩くことができます(歩行が安定している場合)	病院内を一人で自由に歩くことができます(歩行が安定している場合)
栄養 (食事)	絶飲食です (食事や水分は摂ることができません) 	術後も絶飲食です 口が乾く場合は濡れガーゼやスポンジブラシで口腔内を潤します 	CT検査後、問題なければお昼から食事が開始になります 						
清潔			蒸しタオルで体を拭きます	蒸しタオルで体を拭きます	蒸しタオルで体を拭きます	蒸しタオルで体を拭きます 	蒸しタオルで体を拭きます	シャワー浴ができます 入浴日 男性)月・木 女性)火・金	シャワー浴ができます
排泄	オシッコの管が入ります ベッド上で排泄を行っていただきます		オシッコの管を外します 看護師の付き添いで病室トイレで排泄となります	看護師の付き添いで病棟トイレで排泄となります	歩行が安定している場合は一人で病棟トイレで排泄できます	歩行が安定している場合は一人で病棟トイレで排泄できます	歩行が安定している場合は一人で病棟トイレで排泄できます	歩行が安定している場合は一人で病棟トイレで排泄できます	歩行が安定している場合は一人で病棟トイレで排泄できます
教育 説明 指導	主治医が手術の説明を行います 手術室の看護師が説明をします 深部静脈血栓症の説明をします	手術後の説明がご家族にあります 弾性ストッキングを履きます 	CTの結果を説明します 	弾性ストッキングを除去します(状態に応じて)				CTの結果を説明します 退院後の生活の留意点を説明します	 退院です